



كلية : التربية للعلوم الصرفة

القسم او الفرع : الرياضيات

المرحلة: الاولى

أستاذ المادة : (م.د. مصطفى ابراهيم حميد) (م.م. عبدالسلام فائق تلك)

اسم المادة باللغة العربية : التفاضل والتكامل

اسم المادة باللغة الإنكليزية : Calculus

اسم المحاضرة الثامنة باللغة العربية: (التكامل)

اسم المحاضرة الثامنة باللغة الإنكليزية : (Integration)

## Chapter four

### Integration

If  $F(x)$  is a function whose derivative  $F'(x) = f(x)$ , then  $F(x)$  is called an integration of  $f(x)$ , and we will write as.

$$\int f(x)dx = F(x) + c \quad \text{where } c \text{ any constant}$$

Note that the integration can be used to find Area, Volume, Velocity, ...

#### 17- Properties of Integrals

Let  $f(x)$  and  $g(x)$  be integrable. Then ,

$$1 - \int c f(x)dx = c \int f(x)dx, \quad \text{where } c \text{ constant}$$

$$2 - \int (f(x)dx \pm g(x)dx) = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$

$$3 - \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c, \quad \text{where } n \neq -1$$

$$4 - \int \frac{du}{u} = \ln|u| + c$$

$$5 - \int a^u du = \frac{a^u}{\ln(a)} + c, \quad \text{where } a > 0$$

$$6 - \int e^u du = e^u + c$$

$$7 - \int \sin(x) dx = -\cos(x) + c$$

$$8 - \int \cos(x) dx = \sin(x) + c$$

$$9 - \int \tan(x) dx = \ln|\sec(x)| + c$$

$$10 - \int \cot(x) dx = \ln|\sin(x)| + c$$

$$11 - \int \sec(x) dx = \ln|\sec(x) + \tan(x)| + c$$

$$12 - \int \csc(x) dx = \ln|\csc(x) - \cot(x)| + c$$

$$13 - \int \sec^2(x) dx = \tan(x) + c$$

$$14 - \int \csc^2(x) dx = -\cot(x) + c$$

$$15 - \int \sec(x) \tan(x) dx = \sec(x) + c$$

$$16 - \int \csc(x) \cot(x) dx = -\csc(x) + c$$

$$17 - \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c \quad , \quad \int \frac{-dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \cos^{-1} \frac{x}{a} + c$$

$$18 - \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + c \quad , \quad \int \frac{-dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \cot^{-1} \frac{x}{a} + c$$

$$19 - \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \frac{x}{a} + c, \quad \int \frac{-dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \csc^{-1} \frac{x}{a} + c$$

**Example:- Evaluate**

$$1 - \int (x^4 + x^{-3}) dx = \frac{x^5}{5} - \frac{x^{-2}}{2} + c$$

$$2 - \int \frac{x^5 - x^7}{x^2} dx = \int (x^3 - x^5) dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{6} + c$$

$$3 - \int \frac{dx}{x+2} = \ln|x+2| + c$$

$$4 - \int e^{2x-10} dx = \frac{1}{2} e^{2x-10} + c$$

$$5 - \int 3^{x-5} dx = \frac{3^{x-5}}{\ln 3} + c$$

$$6 - \int xe^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} + c$$

$$7 - \int (x+1)^3 dx = \frac{(x+1)^4}{4} + c$$

$$8 - \int \sec^2(x+1) dx = \tan(x+1) + c$$

$$9 - \int (x^3 + 2)^2 dx \quad \text{H. W.}$$

$$10 - \int x\sqrt{1-x^2} dx \quad \text{H. W.}$$