

الخواص الفيزيائية للتربة

الترب المعدنية هي عبارة عن خليط من حبيبات مختلفة الاحجام ومواد عضوية متحللة وهواء وماء. ويتحدد نوع التربة تبعاً لحجم الحبيبات غير العضوية فعند عدم سيادة المواد الغروية فان التربة تكون حصويه او رملية وعند سياده المواد الغروية تكون التربة طينية.

وتلعب نسب الاحجام المختلفة للحبيبات دوراً هاماً في تحديد الخواص الفيزيائية للتربة بما في ذلك حركة الماء والهواء.

لذلك فان الخواص الفيزيائية مهمة في عمليات الزراعة والفلاحة والعزق والري والبزل واداره وصيانة التربة والمياه والتسميد ونمو الجذور وقابلية التربة على تجهيز النبات بالماء والعناصر الغذائية وتهويه التربة. وقابلية التربة على إسناد الأسس والطرق والأبنية والعديد من الاستعمالات الأخرى للتربة. ان على العاملين في الزراعة معرفة خواص التربة الفيزيائية لمعرفة ملائمتها لنمو النباتات ولمعرفة مدى امكانية تحسين تلك الصفات لجعلها اكثر ملائمة لاستعمالات التربة المختلفة. ومن اهم الصفات الفيزيائية هي:-

نسجة التربة soil texture

ينتج من عملية التجوية الكيميائية والفيزيائية للصخور والمعادن حبيبات مختلفة الإحجام تتراوح من حبيبات كبيره مثل الاحجار والحصى والرمل الى حبيبات صغيره جدا مثل حبيبات الطين لذلك فان التوزيع الحجمي للحبيبات هو الذي يحدد مدى خشونة او نعومة التربة وتعرف نسجة التربة تحديدا بأنها نسب الرمل والغرين والطين في التربة. أو هي التوزيع النسبي لمجاميع الاحجام المختلفة لمفصولات التربة Soil Separates وبصورة أدق النسجة تحدد التوزيع النسبي للرمل والغرين والطين . اذن تحدد نسجة التربة مدى خشونة التربة او نعومتها. ولنسجة التربة اهمية كبيره حيث انها تحدد المساحة السطحية النوعية للتربة التي تعتمد عليها الكثير من الخواص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة.

يتم تحديد نسجة التربة أما عن طريق اللمس او عن طريق قياس النسب المختلفة للرمل والغرين والطين في المختبر ويسمى (تحليل حجوم الدقائق)

هناك عدة انظمة متعددة لتصنيف مفصولات التربة منها:

النظام العالمي			نظام قسم الزراعة الامريكي		
المساحة السطحية (سم ² .غم ⁻¹)	القطر (ملم)	المفصولات	المساحة السطحية (سم ² .غم ⁻¹)	القطر (ملم)	المفصولات
11	0.2 - 2	رمل خشن	11	1-2	رمل خشن جداً
113	0.02-0.2	رمل ناعم	23	0.5- 1	رمل خشن
1132	0.002 - 0.02	غرين	45	0.25 - 0.5	رمل متوسط
11321	0.002 >	طين	91	0.1 - 0.25	رمل ناعم
			227	0.05- 0.1	رمل ناعم جداً
			454	0.002- 0.05	غرين
			11321	0.002 >	طين

اذن التربة هي التي تقل اقطار مفصولاتها عن 2ملم . وان الدقائق التي يزيد اقطارها عن 2ملم تسمى بالحصى gravel او الاحجار stones.

اصناف نسجة التربة

ان التربة تتكون من مجموعة من المفصولات تختلف كثيراً في الحجم والشكل. ولأجل تحديد نسجات التربة يجب وضعها في مجاميع اعتماداً على نسب المفصولات المختلفة في التربة.

تسمى هذه المجاميع اصنافاً (classes) وبصوره عامه توجد ثلاث مجاميع رئيسيه وهي المجموعة الناعمة النسجة والمجموعة المتوسطة النسجة والمجموعة الخشنة النسجة. وتوجد داخل هذه المجاميع اصنافاً يبلغ عددها اثنا عشر صنفاً كما مبين في الجدول التالي وكذلك مبينه في شكل يسمى مثلث النسجة.

جدول تصنيف نسجات التربة

sandy الرملية Loamy الرمل المزيجه	مجموعه الترب الخشنه الترب حاويه على 70% رمل او اكثر
Sandy loam المزيجه الرملية	مجموعه الترب متوسطه النسجة
Loam المزيجه	
Silt Loam المزيجه الاغرينيه	
Silty الغرينيه	
Sandy Clay Loam المزيجه الطينية الرملية	
Clay Loam المزيجه الطينية	
Silty Clay Loam المزيجه الطينية الغرينيه	
Sandy Clay الطينية الرملية	مجموعه الترب الناعمة النسجة الترب الحاوية على 40% طين او اكثر
Silty Clay الطينية الغرينيه	
Clay الطينية	




FIGURE 38.—Chart showing the percentages of clay (below 0.002 mm.), silt (0.002 to 0.05 mm.), and sand (0.05 to 2.0 mm.) in the basic soil textural classes.

يعرف بناء التربة بأنه انتظام دقائق التربة الأولية primary particles ومجاميعها aggregates في نظام معين. يؤدي الاختلاف في انتظام هذه الدقائق والمجاميع بين تربة واخرى الى اختلاف فى احجام واشكال وانتظام المساحات البينية pore spaces في الترب والذي يعتبر من اهم التأثيرات المباشرة لتركيب التربة على خواصها الاخرى . ويؤثر بناء التربة والعديد من الخواص التربة مثل حركة المياه، التهوية، المسامية. ان التغيرات التي تحدث في خواص التربة الفيزيائية ينتج العمليات الزراعية المختلفة من حراثة وزراعة وصرف واضافه اسمده عضوية هي عباره عن تغيرات في بناء التربة وليس في نسجة التربة. لغرض وصف بناء التربة يجب ان يشمل ما يلي :

اولا : نوع بناء التربة type ويشمل شكل ونظام تركيب الحبيبات ويشمل :

- 1- التركيب الصفائحي platy
- 2- التركيب الكتلي blocky
- أ. كتلي حاد angular blocky
- ب. كتلي غير حاد sub angular blocky

3- التركيب المنشوري prismatic

4- التركيب الاسطواني columnar

5- التركيب الكروي spheroidal

ويقسم الى أ- حبيبي granular

ب- فتاتي crumb

6- عديمة التركيب structure less

أ-حبيبات منفردة single grain

ب- كتلة صلده massive

ثانياً : صنف البناء class

هي عباره عن وصف حجم size للحبيبات المركبة (peds) وهنا تصنف الانواع حسب حجمها قياس قطر

الحبيبات المركبة بالمسطرة

ثالثا: درجة الوضوح grade

ونقصد به مدى بقاء الدقائق المكونة لوحده التركيب متجمعة دون ان تتكسر وقسمت الى

أ- عديمة التركيب structure less

ب- ضعيف weak

ت- معتدلة moderate

ث- قويه strong

ميكانيكيه تكون بناء التربة في الطبقات السطحية

تقوم جذور النباتات بإفراز مواد كيميائية عضوية تساعد على ربط حبيبات التربة الفردية بعضها ببعض وتكوين حبيبات مركبة ,كما ان التحلل المكروبي لبقايا النبات ينتج عنه مواد عضوية تتفاعل مع حبيبات الطين وتعمل

على التحام الحبيبات المركبة ببعضها لذلك فإن المواد العضوية تعمل على تنشيط تكون الحبيبات المركبة وايضاً تساعد في ثبات هذه الحبيبات .

لون التربة : soil color

احد الصفات المميزة للتربة ، ادركها الانسان بصوره مبكره لسهولة ملاحظتها في الحقل.

فيزيائياً لون التربة هو طول الموجة لكل ماده ترب لون واحد او اكثر .

اما مصدر الالوان في التربة فهي ؟

- 1- قطع الصخور والمعادن السائدة فيها .
- 2- المادة العضوية
- 3- رطوبة التربة
- 4- التغيرات الكيميائية التي تطرأ على بعض المركبات كالأكسدة والاختزال والتميو .

وكأمثله على ذلك

اللون الاخضر : مصدره معدن hematite

اللون الازرق : حالة اختزال لمركبات كثيره

اللون الاسود: ماده عضوية او Biotite مايكا

اللون الابيض : كاربونات ، كبريتات ، Muscovite (مايكا)

كيف تعبر عن اللون

ابتدع العالم منسل munsell طريقة للتعبير عن اللون بأسلوب كمي وتعتمد هذه الطريقة على

ثلاثة عناصر هي

1- دليل الطول الموجي للضوء hue

2- شدة لون عناصر الطيف الموجي value

3- مقياس نقاوة او قوة الاشعاع Chroma

قوام التربة: soil consistency

نقصد به مجموع الظواهر الفيزيائية الناتجة عن قوى التماسك والتلاصق بين مكونات التربة

ولهذه الصفة علاقه مدى سياده احد مفصولات التربة واكثر هذه العناصر في هذه الصفة هو

الطين clay

ان ظواهر قوام التربة تشمل مقاومتها للرض والانضغاط , نعومه وهشاشه التربة اللدانة والسيولة .

وجميع هذه الخصائص تظهر نتيجة لقوه التماسك والتلاصق المختلفة ضمن كميته التربة .

اشكال قوام التربة

1- القوام اللزج sticky يتظاهر بصفة اللزوجة او التلاصق مع مختلف الاجسام .

2- اللدن plastic يحمل صفات الصلابة والقدرة على التشكل .


3- الأملس soft يتصف بكونه هشاً وناعماً .

4- الصلب harsh يتصف بكونه صلباً وقوياً .

علاقة حجم ومكونات التربة

الشكل التالي يمثل حجم وكتلة حالات التربة الثلاث فالشكل بصورته الكاملة يمثل الحجم

والكتلة الكلي للتربة والمقسمة الى ثلاثة مقاطع غير متساوية في كميتها



الكثافة الحقيقية للتربة (كثافة الجزء الصلب) (كثافة الدقائق للتربة) ρ_s

هي النسبة بين كتلة الجزء الصلب الى حجم الجزء الصلب او هي كتلة وحدة الحجم لدقائق التربة الصلبة .
وتقاس عادة في النظام المتري بالغرام لكل سنتيمتر مكعب. تتراوح الكثافة الحقيقية عادة لمعظم الترب المعدنية بين 2.55-2.75 غم.سم⁻³ ويلاحظ ان معظم الترب المعدنية متقاربة في كثافتها الحقيقية ويعود ذلك الى ان معادن الكوارتز والفلدسبار ومعادن السيليكات الغروية المكونة للجزء الاكبر من الترب المعدنية تكون متقاربة بالكثافة الى المدى المذكور اعلاه. عندما تحتوي التربة على نسبة عالية من المادة العضوية فان كثافة التربة الحقيقية ستكون منخفضة نصراً لانخفاض كثافة الدقائق العضوية . لذلك يلاحظ ان كثافة دقائق الترب السطحية تكون اقل من كثافة الطبقات السفلية. وقد تصل قيمة الكثافة الحقيقية في الترب المحتوية على المادة العضوية الى 2.4 غم.سم⁻³ . وبصورة عامة يمكن اعتبار معدل الكثافة الحقيقية 2.65 غم.سم⁻³ للترب الزراعية .

$$\rho_s = M_s / V_s$$

الكثافة الظاهرية للتربة (Pb)

هي النسبة بين كتلة الاجزاء الصلبة الجافة الى الحجم الكلي (حجم الدقائق والمسافات) أو هي كتلة وحده الحجم للتربة الجافة. تتراوح الكثافة الظاهرية لتربة سطحية ناعمة النسجة بين 1.0-1.6 غم/سم³ وتصل في التربة خشنة النسجة 1.2-1.8 غم/سم³ . ويعود سبب انخفاض الكثافة الظاهرية في التربة ناعمة النسجة الى تطور الى تطور اكثر للتركيب في هذه التربة مقارنة بالتربة خشنة النسجة. تصل الكثافة الظاهرية للطبقات تحت السطحية المدكوكة 2.0 غم/سم³ لجميع النسجات ، في حين تكون منخفضة جداً في التربة العضوية تصل بين 0.2-0.6 غم/سم³ ويعود السبب الى المادة المعدنية بالإضافة الى تطور جيد لتركيب التربة. يؤثر نوع المحصول والتسميد العضوي وادارة التربة على كثافة التربة الظاهرية وخصوصاً للطبقات السطحية. وكذلك فان استعمالات الآلات الزراعية وخاصة الثقيلة تؤدي الى زيادة ملحوظة في الكثافة الظاهرية للتربة وخصوصاً تحت المنطقة الواقعة اسفل الحرث مباشرة.

$$Pb = Ms / Vt = Ms / (Va + Vw + Vs)$$

نسبة الفراغات (e) void ratio

نسبة حجم المسام المملوء بالماء والهواء الى حجم الجزء الصلب

$$e = (Va + Vw) / Vs = Vf / (Vt - Vf)$$

المسامية الكلية (E) porosity

النسبة بين حجم المسام المشغولة بكل من الماء والهواء الى الحجم الكلي للتربة. وتعتمد كمية هذه المسامات بدرجة كبيرة على طريقة انتظام دقائق التربة ومجاميعها فيما بينها. فكلما اقتربت الدقائق من بعضها كما في التربة الرملية او التربة المدكوكة فان المسامية ستكون منخفضة . اما اذا كانت منتظمة على شكل مجاميع مسامية كما في التربة المتوسطة النسجة الحاوية على نسب عالية من المادة العضوية فان النسبة المئوية للمسامات ستكون عالية.

ويمكن قياس المسامية بالمعادلة التالية:

$$E = Vf / Vt = (Va + Vw) / (Vs + Va + Vw)$$

ان وجود نسبة كبيرة من الدقائق الصلبة في مجاميع مسامية سيؤدي ذلك الى انخفاض الكثافة الظاهرية للتربة وبما ان كثافة دقائق التربة المعدنية لا تختلف كثيراً في التربة المختلفة لذا فان زيادة المسامية او انخفاضها تتناسب عكسياً مع زيادة او انخفاض الكثافة الظاهرية وكما في المعادلة التالية.

$$E = (1 - Pb / Ps) \times 100$$

تؤثر عوامل عديدة على مسامية التربة كالحراثة والتسميد ونوع الآلات المستعملة والرعي ونوع المحصول وطريقة ادارة التربة.

حساب مجموع المسامات البينية

تعيين الحجم الكلي للمسافات البينية

يمكن استخدام اسطوانات التربة المستعملة في تعيين الكثافة الظاهرية للتربة لتعيين الحجم الكلي للمسامات البينية وتوضع اسطوانات التربة في اناء من الماء للتشبع فعليا بالماء بعد ذلك توزن الاسطوانات . ان الفرق بين وزن التربة المشبعة والتربة المجففة بالفرن يعطي حجم الماء المساوي لحجم المسافات البينية في التربة

مثال/في الحقل واحد متر مكعب من التربة يظهر كما يلي :

لحساب الكثافة الظاهرية للتربة

الحجم = 1م^3 (جزء صلب + مسامات)

الوزن = 1.33مغ (جزء صلب فقط)

الكثافة الظاهرية = 1033 ميكا غرام /م

عند ضغط الحبيبات الصلبة يظهر المكعب كما يلي

لحساب الكثافة الحقيقية للتربة

الحجم = 0.5م

الوزن = 1033 ميكا غرام

الحجم يشمل الجزء الصلب فقط

الوزن يشمل الوزن الصلب فقط

الكثافة الحقيقية = 2.66 ميكا غرام/م

مثال/اخذت عينه تربة من الحقل بواسطة أسطوانة وتم تجفيف عينه التربة في الفرن عند درجة حراره 105م

وكانت النتائج كما يلي

ارتفاع الأسطوانة $h=50\text{سم}$

قطر الأسطوانة = 4.4سم

وزن عينه التربة الجافه = 876غم

احسب الكثافة الظاهرية للتربة

الحل:

حجم عينه التربة = حجم الأسطوانة

حجم الأسطوانة (التربة) $h=76.0\text{سم}$

الكثافة الظاهرية = 1.15غم/سم

مثال/احسب وزن التربة اللازمة لمليء صندوق انبات البذور القابلة

طول = 1م

العرض = 20سم

الارتفاع = 10سم

اذا علمت ان الكثافة الظاهرية للتربة = 1.1غم/سم

الحل:

وزن التربة = الكثافة الظاهرية \times حجم التربة

$100 \times 20 \times 15 \times 1.1 =$

$33\text{كغم} =$